

Standardtherapie

Pantoprazol	40mg	1/0/1
Clarithromycin	500mg	1/0/1
Amoxicillin	1000mg	1/0/1

Diese Medikamente morgens und abends **über 7 Tage** einnehmen

Frühestens 4-6 Wochen nach der Therapie Stuhltest oder Atemtest auf Helicobacter

Wenn Behandlung erfolglos:

Ersatztherapie :

Pantoprazol	40mg	1/0/1
Mycobutin	150mg	1/0/1
Clarithromycin	500mg	1/0/1

Diese Medikamente werden **über 10 Tage** morgens und abends eingenommen.

Frühestens 4-6 Wochen nach Therapie Stuhltest oder Atemtest auf Helicobacter

Damit sollte der Helicobacter erfolgreich behandelt sein. Falls dies nicht der Fall sein sollte:
Quadrupelschema nach Rücksprache:

Quadrupelschema

Tetracyclin	500mg	1/1/1/1
Amoxicillin	1000mg	1/0/1/0
Angass	200mg	1/1/1/1 Wismuthpräparat, rezeptfrei, 40 Stück ca 20 Euro
Pantoprazol	40mg	1/1/1/0

Die Medikamente werden **über 7 Tage** nach dem obigen Schema eingenommen.

Ebenfalls wird nach 4-6 Wochen wieder ein Stuhltest oder Atemtest auf Helicobacter durchgeführt.