

Vorbereitung zur Darmspiegelung/Koloskopie

Dosieranleitung 2 x 45ml Fleet Lösung oder 2x90ml Colophos

ERNÄHRUNG

Wichtig: Meiden Sie bitte bereits 5 Tage vor der Untersuchung Vollkornprodukte sowie Müsli, Tomaten, Trauben und Beeren.

Am Vortag der Untersuchung

Nicht erlaubt sind: Früchte, Gemüse, Salat, Milchprodukte, rote Getränke, naturtrübe Säfte. Mittagessen möglich. Zum Abendessen bitte nur noch eine klare Boullion, Säfte und klare Flüssigkeiten möglich.

MEDIKATION

Fleet oder Colophos nehmen Sie bitte wie folgt ein:

Stellen Sie Fleet oder Colophos für ca. 20 min. vor Einnahme in den Kühlschrank, aber bitte nicht darin lagern. Das Fleet oder Colophos nicht verdünnen, zu besseren Einnahme dürfen sie etwas Tee oder Sirup, max. 1 dl, beimischen.

Am Vortag der Untersuchung

Bitte trinken Sie die erste Flasche bereits um 14 Uhr, wenn die Untersuchung vor 11 Uhr am nächsten Tag stattfindet. Andernfalls nehmen Sie die erste Flasche erst vor dem Abendessen um 18:00 Uhr ein. Anschließend trinken Sie bitte sofort ein bereitgestelltes Glas Wasser oder Tee. Zusätzlich bitte im Laufe des Abends weitere 2 l Flüssigkeit trinken. Im Fall der Untersuchung vor 11 Uhr nehmen Sie bereits die zweite Flasche um 18 Uhr ein.

Am Untersuchungstag, wenn Untersuchung um 11 Uhr oder später

Die zweite Flasche Fleet oder Colophos trinken Sie am Untersuchungsmorgen um 06:00 Uhr. Zusätzlich sollten Sie in 1-2 Stunden 1-2 Liter klare Flüssigkeit nach Belieben zu sich nehmen.

Bis 2 Stunden vor der Untersuchung können Sie noch Flüssigkeit zu sich nehmen und Ihre regelmäßigen Medikamente einnehmen.

Bei Diabetes mellitus keine Blutzucker senkenden Medikamente einnehmen.

Bitte denken Sie auch daran, 5 Tage vor der Untersuchung keine blutverdünnenden Medikamente (Marcoumar, Aspirin, Plavix usw.) einzunehmen – Ausnahmen werden im Einzelfall besprochen.

Wichtig: Haben Sie den Einverständnisbogen gelesen, ausgefüllt und unterschrieben? Bitte mitbringen!

Achtung: Kommen Sie nicht mit dem eigenen Wagen, da durch die mögliche Sedierung während der Untersuchung Ihre Fahrtauglichkeit nicht gewährleistet ist.